

X JORNADA CIENTÍFICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - 2007
BRASÍLIA-DF

**ANÁLISE DO PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
E SUAS COMPLICAÇÕES NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO**

*Sérgio Arruda, Fábio França, Erika Figueiredo, Henrique Branisso, Maycon Silva, Mariana Melendez,
Cibele Neves, Patrícia Lima, Thiego Araújo*
Clínica Dr. Sérgio Arruda - Cirurgia Geral e Bariátrica

JUSTIFICATIVA: A cirurgia bariátrica é a única opção de tratamento para a obesidade mórbida e como todo procedimento cirúrgico pode apresentar complicações.

OBJETIVO: Analisar a morbi-mortalidade de uma série de pacientes consecutivos submetidos a gastroplastia redutora por um único cirurgião.

MATERIAL E MÉTODO: De janeiro/2004 a fevereiro/2007, 255 pacientes foram submetidos à cirurgia de Fobi-Capella. Os dados demográficos foram coletados retrospectivamente, as comorbidades avaliadas no pré-operatório e o seguimento realizado após a cirurgia.

RESULTADOS Dos 255 pacientes, 214 eram do sexo feminino (83,9%). A média de idade foi de 35,7 anos (16-59). O índice de massa corporal médio foi de 42,4 Kg/m² (35,0-61,0 Kg/m²). O número médio de comorbidades foi 3,53 ± 1,95, sendo a hipertensão arterial a mais prevalente (51,4%), seguido por dislipidemia (46,3%), artropatia (44,7%), doença do refluxo gastro-esofágico e síndrome da apnéia obstrutiva do sono (29,0%). O tempo médio da cirurgia foi de 3,23h e o tamanho médio da incisão foi 11cm (7-17,5cm). O anel do neo-reservatório gástrico foi colocado em 207 pacientes (81,2%). O tempo de internação médio foi 3,79 ± 1,4 dias. O suporte de terapia intensiva foi utilizado no pós-operatório imediato em 237 pacientes (92,9%). Houve uma reoperação devido a dor intensa e taquicardia, com laparotomia branca. Como complicações pós-operatórias, houve uma embolia pulmonar, um edema agudo de pulmão e um caso de rabdomiólise. Nenhum caso de fístula digestiva. A mortalidade nessa série foi zero.

Conclusão: A cirurgia bariátrica é realizada em pacientes com número elevado de comorbidades. No entanto, em relação ao porte da cirurgia, o número de complicações no pós-operatório é baixo.